

LICENCE O.M.I. - T.D. Induction

EXERCICE 1 On rappelle que les nombres de Fibonacci sont définis par $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ pour $n > 1$ et $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Montrer que pour tout $n > 0$:

- 1) $F_1 + F_3 + \dots + F_{2n-1} = F_{2n}$.
- 2) $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.
- 3) $F_1^2 + F_2^2 + \dots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$
- 4) (Janvier 97) F_{3n} est pair.
- 5) $\varphi^{n-2} \leq F_n \leq \varphi^{n-1}$, où $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. ◇

EXERCICE 2 (Contre exemples) On considère les propriétés $P(n)$: “ $9 \mid 10^n - 1$ ” et $Q(n)$: “ $9 \mid 10^n + 1$ ”.

- 1) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n) \implies P(n+1)$ et $Q(n) \implies Q(n+1)$
- 2) Trouver les valeurs de n pour lesquelles $P(n)$ (resp. $Q(n)$) est vraie.
- 3) Mêmes questions pour $R(n)$: “ $3 \mid 4^n + 7^n$ ”. ◇

EXERCICE 3 (exam Janvier 96) Donner une définition inductive de $f(n) = a^{2^n}$.

Indication. On pourra remarquer que $a^{2^{n+1}} = \left(a^{2^n}\right)^2$. ◇

EXERCICE 4 1) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $(n+1)^2 - (n+2)^2 - (n+3)^2 + (n+4)^2 = 4$.

2) En déduire que tout entier m peut s'écrire comme somme et différence des carrés $1^2, 2^2, \dots, n^2$ pour un certain n , c'est-à-dire

$$\forall m \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \exists \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, 1\}, m = \varepsilon_1 1^2 + \varepsilon_2 2^2 + \dots + \varepsilon_n n^2$$

(Indication: montrer d'abord le résultat pour $m \in \{0, 1, 2, 3\}$). ◇

EXERCICE 5 Donner une définition inductive de la hauteur $h(t)$, du nombre de nœuds $n(t)$, du nombre d'arêtes $a(t)$ et du nombre de feuilles $f(t)$ d'un arbre binaire. ◇

EXERCICE 6 Soit t un arbre, $h(t)$ sa hauteur, $n(t)$ le nombre de ses nœuds, $f(t)$ le nombre de ses feuilles. On suppose que t est un arbre binaire (0, 1 ou 2 fils par nœud). Montrer que $n(t) \leq 2^{h(t)} - 1$, et que $f(t) \leq 2^{h(t)-1}$. ◇

EXERCICE 7 Soit t un arbre binaire *strict* (c'est-à-dire que t est non vide, chaque nœud de t a exactement 0 ou 2 fils et il n'y a aucun nœud avec un seul fils non vide). Soit $n(t)$ le nombre de ses nœuds, $f(t)$ le nombre de ses feuilles et $a(t)$ le nombre de ses arêtes.

- 1) Donner une définition de l'ensemble *ABS* des arbres stricts.
- 2) Montrer que si t est un arbre binaire *strict* non vide $n(t) = a(t) + 1$.
- 3) Montrer que si t est un arbre binaire *strict* non vide $n(t) = 2f(t) - 1$. ◇

EXERCICE 8 Un arbre n -aire *complet* est un arbre où :

- chaque nœud interne a exactement n fils,
- toutes les feuilles sont à la même profondeur.

L'arbre vide est un arbre n -aire de profondeur 0.

- 1) Donner une définition inductive des arbres n -aires complets et étiquetés sur l'alphabet $A = \{a\}$ (toutes les feuilles sont des a).
- 2) Calculer le nombre de nœuds et le nombre d'arêtes d'un arbre n -aire complet de profondeur k . ◇

T.S.V.P.

EXERCICE 9 Un arbre binaire est *équilibré* si pour chaque noeud de l'arbre, la différence de hauteur des sous-arbres gauche et droit est au plus 1.

- 1) Donner une définition de l'ensemble *AVL* des arbres binaires équilibrés.
- 2) On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par: $u_0 = 0, u_1 = 1$ et

$$\forall n \geq 0, \quad u_{n+2} = u_{n+1} + u_n + 1.$$

Montrer que $\forall x \in AVL, n(x) \geq u_{h(x)}$, où h et n sont les fonctions donnant respectivement la hauteur et le nombre de noeuds d'un arbre. \diamond

EXERCICE 10 Définir le parcours préfixe d'un arbre binaire. \diamond

EXERCICE 11 Soit A^* le monoïde libre engendré par l'alphabet A .

Le miroir d'un mot $u = a_1 a_2 \cdots a_n$ est le mot $\tilde{u} = a_n \cdots a_2 a_1$. Donner une définition inductive du miroir. \diamond

EXERCICE 12 Les listes de lettres L de l'alphabet A sont définies inductivement par:

- (B) $\varepsilon \in L$,
- (I) $\forall l \in L, \forall a \in A, (al) \in L$.

Définissons $g(x, y)$ sur $L \times L$ par, $\forall a \in A, \forall l \in L, \forall y \in L$,

$$\begin{aligned} g(\varepsilon, y) &= y, \\ g((al), y) &= g(l, (ay)). \end{aligned}$$

- 1) Soit $Q(x)$ le prédicat " $\forall y, g(x, y)$ est défini". Prouver par induction sur x que $Q(x)$ est vrai sur L .
- 2) Calculer $g((a_1), y)$, pour $a_1 \in A, y \in L$.
- 3) Prouver par induction sur n (pour $n \geq 1$) que

$$g((a_n(a_{n-1}(\dots(a_1)\dots))), y) = g(\varepsilon, (a_1(\dots(a_{n-1}(a_n y))\dots))).$$

- 4) Soit $rev(x) = g(x, \varepsilon)$. Dédurre de la question 3 que, pour $a_1, \dots, a_n \in A$,

$$rev((a_n(a_{n-1}(\dots(a_1)\dots)))) = (a_1(\dots(a_{n-1}(a_n))\dots)). \quad \diamond$$

EXERCICE 13 Soit $F_0 = \{a\}, F_1 = \{s\}, F = F_0 \cup F_1$. L'ensemble T des termes construits sur F est $T = \{a, s(a), s(s(a)), \dots\}$.

Posons $V = \mathbb{N}$. Soit $h: F_0 \rightarrow V$, et $h_s: V \rightarrow V$; il existe une et une seule fonction h^* de T dans V telle que:

- (B') Si $t \in F_0, h^*(t) = h(t)$,
- (I') Si $t = f(t_1, \dots, t_n), h^*(t) = h_f(h^*(t_1), \dots, h^*(t_n))$.

Calculer h^* dans les cas suivants : 1) $h_1(a) = 0, h_{1s}(n) = n + 1$.

2) $h_2(a) = 1, h_{2s}(n) = 2n$.

3) $h_3(a) = 1, h_{3s}(n) = n + 2$. \diamond

EXERCICE 14 Soit X un ensemble de "variables" et F un ensemble de "fonctions", on définit inductivement l'ensemble $T(F, X)$ des termes sur F et X de la façon suivante :

- (B) Si $x \in X$ alors $x \in T(F, X)$; si $f \in F_0$, alors $f \in T(F, X)$;
- (I) Si $t_1, \dots, t_n \in T(F, X), n \geq 1$ et $f \in F_n$, alors $f(t_1, \dots, t_n) \in T(F, X)$.

Une application φ de $T(F, X)$ dans $T(F, X)$ est un *morphisme* si elle vérifie $\varphi(f(t_1, \dots, t_n)) = f(\varphi(t_1), \dots, \varphi(t_n))$. Soit une application h de X dans $T(F, X)$, montrer qu'il existe un morphisme unique h^* de $T(F, X)$ dans $T(F, X)$ qui prolonge h (c'est à dire, tel que $\forall x \in X, h^*(x) = h(x)$). \diamond

EXERCICE 15 Soit G un graphe (non orienté) connexe à n sommets. Montrer par récurrence sur n que G a au moins $n - 1$ arêtes. Indication : ne pas faire le raisonnement *faux* suivant : “soit G connexe à n sommets, ajoutons un sommet supplémentaire pour obtenir un graphe G_1 à $n + 1$ sommets, pour que G_1 soit connexe, il faut relier le nouveau sommet à G par au moins une arête, or (par hypothèse de récurrence) G a au moins $n - 1$ arêtes, donc G_1 a au moins n arêtes, CQFD...” \diamond

EXERCICE 16 (exam Janvier 97) On considère les suites finies de 0 et de 1, c'est-à-dire les mots du monoïde libre $M = \{0, 1\}^*$. On définit le sous-ensemble L de M par

(B) $\varepsilon \in L, 001 \in L,$

(I) si $w = a_1 \dots a_n \in L$ et p est une permutation de $\{1, \dots, n\}$ alors $w' = a_{p(1)} \dots a_{p(n)} \in L$
si $w_1 \in L$ et $w_2 \in L$ alors $w_1 w_2 \in L$.

Montrer par induction que pour tout mot $w \in L, |w|_0 = 2|w|_1$. Obtient-on ainsi tous les mots qui ont deux fois plus de 0 que de 1? Justifiez votre réponse. \diamond

EXERCICE 17 On considère le monoïde libre M sur un alphabet fini A . On note u^p le mot $u \dots u$, où p exemplaires de u ont été concaténés. On dit que mot u est un *facteur gauche* d'un mot v , s'il existe un mot w tel que $v = uw$, (de même, u est *facteur droit* de v si on peut écrire $v = wu$). Soit α et β deux mots.

1) Montrer qu'une condition nécessaire et suffisante pour que l'un d'entre eux soit *facteur gauche* de l'autre est qu'il existe deux mots u et v tels que $\alpha u = \beta v$.

2) On suppose que $\alpha\beta = \beta\alpha$. Montrer que cela équivaut à : $\exists \gamma \in M, \exists (p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \alpha = \gamma^p, \beta = \gamma^q$. \diamond

EXERCICE 18 Les notations sont les mêmes que dans l'exercice précédent Exercice 17. On appelle *langage* (sur l'alphabet A) un sous-ensemble de M . On définit inductivement les langages *rationnels* (on dit aussi *réguliers*) par :

(i) Un langage fini est rationnel,

(ii) Si L_1 et L_2 sont rationnels alors $L_1 \cup L_2$ est rationnel,

(iii) Si L_1 et L_2 sont rationnels alors $L_1 L_2 = \{uv, u \in L_1, v \in L_2\}$ est rationnel,

(iv) Si L est rationnel alors $L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n$ est rationnel ($L^0 = \{\varepsilon\}$).

On appelle *miroir* du mot $u = a_1 \dots a_n$, le mot $\tilde{u} = a_n \dots a_1$. Si L est un langage, on définit $\tilde{L} = \{\tilde{u}, u \in L\}$. Montrer que si L est un langage rationnel, alors \tilde{L} est également rationnel. \diamond

EXERCICE 19 Soit A un alphabet fini et \bar{A} un alphabet disjoint de A et en bijection avec A . Si $a \in A$, on notera \bar{a} l'image de a par cette bijection. On définit une application $\tau: (A \cup \bar{A})^* \rightarrow A^* \cup \{\perp\}$ par :

(i) $\tau(\varepsilon) = \varepsilon$

(ii) $\tau(\alpha a) = \perp$ si $\tau(\alpha) = \perp$ et $\tau(\alpha)a$ sinon,

(iii) $\tau(\alpha \bar{a}) = \perp$ si $\tau(\alpha) = \perp, \beta$ si $\tau(\alpha) = \beta a$ et \perp sinon.

1) Calculer $\tau(\alpha)$ avec $\alpha = a b \bar{b} a \bar{a} \bar{a}$

2) Montrer :

a) $\tau(\alpha) = \perp \Rightarrow \forall \beta, \tau(\alpha\beta) = \perp,$

b) $\tau(\alpha) = \tau(\beta) \Rightarrow \forall \gamma, \tau(\alpha\gamma) = \tau(\beta\gamma)$

c) $\tau(\alpha) \neq \perp$ et $\tau(\beta) \neq \perp \Rightarrow \tau(\alpha)\tau(\beta) = \tau(\alpha\beta)$. \diamond

EXERCICE 20 (exam Septembre 95) On dit qu'un ensemble ordonné est un *treillis* si tout sous-ensemble fini d'éléments de E admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Montrer qu'un ensemble ordonné (E, \leq) est un treillis si et seulement si tout sous-ensemble à deux éléments de E admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Indication: montrer par récurrence sur n que si tout sous-ensemble à deux éléments de E admet une borne supérieure et une borne inférieure, alors tout sous-ensemble fini à n éléments de E admet une borne supérieure et une borne inférieure. \diamond

EXERCICE 21 Soient (E, \leq) et (E', \leq') deux ordres bien fondés. $E \times E'$ muni de l'ordre produit (resp. lexicographique) est-il bien fondé ? \diamond

EXERCICE 22 Les ordres suivants sont-ils bien fondés ?

1. sur A^2 , l'ordre lexicographique (A alphabet totalement ordonné).
2. sur \mathbb{N} $m \leq n$ ssi m divise n .
3. sur l'ensemble des diviseurs d'un entier donné, la relation du 2.
4. sur A^* , l'ordre préfixe.
5. sur A^* , l'ordre $u \leq v$ ssi u est un sous-mot de v .
6. sur A^* , l'ordre lexicographique (A alphabet totalement ordonné).
7. sur A^*/\equiv , l'ordre des longueurs $u \leq v$ ssi $|u| \leq |v|$ (où \equiv est défini par $u \equiv v$ si et seulement si $|u| = |v|$). \diamond

EXERCICE 23 (Fonction d'Ackerman) Soit $f: N \times N \rightarrow N$ définie par :

$$\begin{aligned} f(0, n) &= n + 1, \\ f(m, 0) &= f(m - 1, 1), \\ f(m, n) &= f(m - 1, f(m, n - 1)). \end{aligned}$$

- 1) Montrer que $f(m, n)$ est définie pour tout couple $(m, n) \in N \times N$.
- 2) Calculer $f(1, n)$ et $f(2, n)$. \diamond